

# 令和8年8月千葉豪雨に対する「にんじん」の事後対策

令和8年8月19日  
農林水産部担い手支援課

## 「にんじん」における事後対策

| ほ場の状況                                              | 対 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 豪雨では場の大半が土壌流亡等により被害（収穫見込みが無い場合）                    | ● <u>播き直し</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ＜発芽後のほ場＞<br>ほ場が冠水したが、水が引いてニンジンが残っている状態（収穫見込みが有る場合） | <ul style="list-style-type: none"> <li>●生育ステージが小さいので<u>丁寧な中耕作業</u>。</li> <li>●必要に応じて、希釈濃度を薄めて<u>葉面散布剤を散布</u>。</li> <li>●病徴がないかよく観察を行い、<u>5～6 葉期になったら速やかに薬剤防除（殺菌剤）</u>。</li> </ul> <p>※5 葉期末満の生育ステージでは薬害リスクがあるので注意。</p>                                                                                                                                                                                       |
| ＜播種直後（発芽前）のほ場＞<br>ほ場が冠水したが、水が引いている状態（発芽の可能性のある場合）  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「たがやす」等の中耕機により<u>土壌表層を中耕</u>し様子をみる（写真参照）。</li> <li>●水が引いて数日（5 日程度）しても発芽しない又は著しく発芽率が悪い場合は<u>播き直し</u>。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>歯車の車輪が土壌を反転させながら中耕。表層をほぐすと同時に土壌中へ酸素供給する。※商品名「たがやす」（株）向井工業</p> </div> </div> |

### ＜「播き直し」について＞

#### ●播種の限界時期は「8月末まで」（＊）

ただし、水がひいて作業に入れる状態になったら速やかに行いましょう。  
※9月以降の播種は、肥大不足、尻細や着色不良の発生が多くなります。

#### ●品種の選択（＊）

**年内収穫** ⇒「**愛紅**」（住化アグリテック）…肥大が早い

**年明け収穫** ⇒「**れいめい**」（横浜植木）…低温期でも肥大が進む

＊令和5年度の試験結果であり、秋の天候状況によっては、収量が確保できない恐れがあります。

（参考）試験研究データ…引用：主要露地野菜の台風対策技術（農林水産技術会議 R8.3 月）

| 品種名（種苗会社）    | 播種日     | 収穫日      | 平均根重 | ML 率 | A 品率 |
|--------------|---------|----------|------|------|------|
| 愛紅（住化アグリテック） | R5.8.29 | R5.12.22 | 151g | 80%  | 73%  |
| れいめい（横浜植木）   | R5.8.29 | R6.1.25  | 136g | 76%  | 78%  |

### ＜「にんじん」に登録のある主な殺菌剤＞

| 薬剤名        | FRAC   | 適用病害                   | 希釈倍数                  | 使用時期       | 使用回数  |
|------------|--------|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| ストロビーフロアブル | 11(C3) | 黒葉枯病<br>斑点病            | 2000-3000 倍<br>3000 倍 | 収穫 7 日前まで  | 3 回以内 |
| ロブラール水和剤   | 2(E3)  | 黒葉枯病、斑点病               | 1000-1500 倍           | 収穫 14 日前まで | 4 回以内 |
| ベルコートフロアブル | MO7    | 黒葉枯病、斑点病、<br>うどんこ病、菌核病 | 1000 倍                | 収穫 14 日前まで | 5 回以内 |

（注意）農薬使用前にラベル表示で再度、登録内容を確認しましょう！